

**MAMIFEROS DEL MACIZO COLOMBIANO QUE HABITAN LAS AREAS DE BOSQUE ALTOANDINO Y
PARAMO. Por Lilina Patricia Paz 1999**

ORDEN	NOMBRE CIENTIFICO	NOMBRE REGIONAL	CARACTERISTICAS	REPORTES
Artiodactyla	<i>Lama guanicae</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Artiodactyla	<i>Mazama americana</i>	Soche colorado	Hasta 2000 msnm. S Mexico hacia el sur hasta N Argentina. Diurno y nocturno, terrestre, solitario. Habita bosques secundarios maduros, jardines y cultivos. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). CITES II (Emmons,1990). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Artiodactyla	<i>Mazama rufina rufina</i>	Venado, uchpataruca	500- 4000 msnm. Diurno. Terrestre. Herbivoro Uso: Ornamental, comercio ocasional. (ISAGEN, 1997)	Cuenca alta del río Caquetá (ISAGEN,1997). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).
Artiodactyla	<i>Odocoileus virginianus</i>	Atontaruca	500-4000 msnm. Diurno. Terrestre. Herbivoro. Usos: Ornamental, comercio ocasional (ISAGEN,1997)	Amenazada de extinción; para Colombia catalogada como en via de extincion (ISAGEN, 1997). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).
Artiodactyla	<i>Odocoileus virginianus Goudotii</i>	Venado de paramo		Volcan Galeras. Una de las especies mas amenazadas de Colombia.(Rangel, 1995)

Artiodactyla	<i>Pudu mephistophiles wetmorei</i>	Venado conejo	Es el venado mas pequeño del mundo y es muy primitivo.	Endémico de la región del macizo colombiano. CITES I y la UICN la cataloga como en via de extincion. (ISAGEN, 1997). Indeterminado (IUCN,1982). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Lutra longicaudis</i>	Nutria	Hasta 3000 msnm. N Mexico hacia el sur hasta Uruguay. Probablemente diuna y nocturna, semiacuatica. Presion por caza. (Emmons,1990)	CITES I (Emmons,1990). Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace).
Carnívora	<i>Canis (Cerdocyon) thous</i>	Zorro perruno	Distribucion andina (VON HUMBOLDT, 1998)	CITES III. Uso: Comercio. (VON HUMBOLDT,1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Canis culpaeus reissi</i>	Lobo	Paramos de Nariño-Putumayo (VON HUMBOLDT,1998)	
Carnívora	<i>Conepatus semistriatus semistriatus</i>	Mapuro, zorrillo, mofeta	Hasta 4100 msnm. En Suramerica: Costas de Peru y Ecuador, N Colombia y Venezuela y altas elevaciones de los Andes; E Brasil central. Nocturno, terrestre. Habita bosques montanos y sabanas. Raramente cazado. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos de Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Eira barbara</i>	Zorro urama, mapure, huron	0-3200 msnm. (ISAGEN,1997). Sur de Mexico hacia el sur hasta Peru y Bolivia.Nocturno, terrestre. Habita el bosque lluvioso y la sabana (Emmons,1990) Uso:	CITES II (ISAGEN,1997). CITES III. (VON HUMBOLDT,1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)

			Alimento, medicinal, escenico, comercio (VON HUMBOLDT, 1998)	
Carnívora	<i>Felis colocola</i>			
Carnívora	<i>Felis concolor</i>	Pucatigre	0-4500 msnm. Desde Alaska hasta el sur de Argentina y Chile.(Emmons,1990) Diurno-nocturno. Terrestre- arbóreo. Carnívoro.(ISAGEN,1997) Amenazado por caza y destruccion de su habitat (Emmons,1990)	CITES I y la UICN la cataloga como vulnerable (ISAGEN, 1997). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983). Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Carnívora	<i>Felis concolor soederstromi</i>	Puma		Amenazada de extincion
Carnívora	<i>Felis onca</i>	tigre mariposo, tigre real	Mexico hasta Argentina Nocturno, diurno. Terrestre. Solitario Habitan desde bosques humedos hasta pastizales humedos. Presionado por la destruccion del habitat. (Emmons,1990)	CITES I. (Emmons,1990) Categoria UICN,1996: Casi amenazada, bajo riesgo (Von Humboldt,1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Felis pardinoides tigrina</i>	Tigrillo, tigre gallinero, tigrillo peludo	Hasta 3200 msnm. Costa Rica hacia el sur hasta Brasil, N Argentina y bosques de la costa Atlantica del SE de Brasil Habita bosques altoandinos. (Emmons,1990)	CITES I (ISAGEN,1997), Vulnerable (IUCN,1982). Casi amenazada, de bajo riesgo (VON HUMBOLDT,1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Herpailurus yagouaroundi</i>	Sachamichito, gato montes, gato pardo	0-3200 msnm. (ISAGEN,1997). Texas hacia el sur hasta S Brasil y Paraguay. (Emmons, 1990) Diurno. terrestre-arbóreo. Omnívoro. (ISAGEN,1997)	CITES I y la UICN la considera Vulnerable (ISAGEN, 1997). Parque Nacional Natural Cueva Purace (Mamíferos Purace).Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)

Carnívora	<i>Mustela frenata affinis</i>	Comadreja; alcomono, chuchuro	300-3000 msnm.(ISAGEN,1997) Hasta 4000 msnm (Emmons,1990). Canada hasta Bolivia (Emmons,1990) Diurno-nocturno; arbóreo. Carnívoro. (ISAGEN, 1997)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Mustela philipei</i>		Especie endémica de la Provincia Biogeográfica Nor Andina (Von Humboldt, 1998)	Categoría IUCN,1996: Amenazada (Von Humboldt, 1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Nasua nasua</i>	Cusumbe, guache	0 – 3000 msnm.(ISAGEN,1997). E de los Andes a través de todos los países desde Colombia y Venezuela hacia el sur hasta Argentina y Uruguay. (Emmons,1990). Diurno. Terrestre- arbóreo. Omnívoro. (ISAGEN,1997)	CITES III (Emmons,1990).. Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Nasuella olivacea</i>	cusumbo; cusumbe	300? - 3500 msnm. Diurno. terrestre- arbóreo. Omnívoro. (ISAGEN, 1997).	Se presenta en el Volcan Galeras. (Rangel 1995). Datos deficientes (Von Humboldt, 1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Potos flavus megalotus</i>	Tutamono, perro de monte, oso mielero, leoncillo, micoleon	0-3000 msnm. Diurno. Terrestre- arbóreo; omnívoro. (ISAGEN,1997). Sur de Mexico hacia el sur hasta Bolivia y Mato Grosso en Brasil (Emmons,1990) Uso: Mascota, cazado por su carne. (CVC,1991)	CITES III (Emmons,1990). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Carnívora	<i>Tremarctos ornatus</i>	Oso de anteojos	1800.3300 msnm (Emmons, 1990). Diurno; terrestre – arbóreo;	CITES I y la UICN la cataloga como en vía de extinción

			omnivoro. (ISAGEN,1997). Unico ursido Sudamericano (CEMEX,1997)	(ISAGEN, 1997) Se presume su existencia en el Volcan Galeras. (Rangel, 1995)
Chiropera	<i>Histiotus montanus</i>		Mayor de 2000 msnm. Paramos andinos (Von Humboldt,1990) A traves de toda la Cordillera Andina y Suramenrica subtropical y templada, montes de Venezuela, E Brasil y Paraguay. Habita bosques montanos (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Chiroptera	<i>Anoura caudifer aequatorialis</i>		Hasta 3000 msnm. Andes. Se alimenta de nectar, insectos, frutos y polen (Emmons, 1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Chiroptera	<i>Anoura cultrata</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Chiroptera	<i>Anoura geoffroyi peruana</i>	Murcelao	0-3000 msnm. Volador. Particularmente omnivoro. (ISAGEN,1997) Distribucion andina (Von Humboldt, 1998)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Chiroptera	<i>Eptesiscus fuscus</i>		Desde Canada hasta Argentina y Uruguay. Comun en habitats abiertos, bosques humedos, jardines. (Emmons,1990) Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt, 1998)	
Chiroptera	<i>Lasiuris cinereus subsp.</i>		Desde Canada hasta Chile. Habita bosques montanos. Se alimenta de insectos (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos purace)
Chiroptera	<i>Myotis oxyotus</i>		Paramos Andinos (Von Humboldt,1998) Subartico hasta ecuatorial. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Chiroptera	<i>Sturnira bidens</i>		0-3500 msnm. C Mexico hacia el	Parque Nacional Natural

			sur hasta N Argentina. Se alimenta de frutos y nectar. Bosques nublados, montanos (Emmons,1990)	Purace (Mamíferos Purace). Categoría UICN ,1996: Bajo riesgo, casi amenazada. (Von Humboldt,1998)
Chiroptera	<i>Sturnira erythromus</i>		0-3500 msnm. C Mexico hacia el sur hasta N Argentina. Se alimenta de frutos y nectar. Bosques nublados, montanos (Emmons,1990)	Registrada en PNNPurace (UEASPNN,1998)
Chiroptera	<i>Vampyrum spectrum</i>		S Mexico al sur hasta N Bolivia y N y S de la cuenca amazonica. Se alimenta de aves, roedores y posiblemente de frutas. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Edentata	<i>Choloepus augustinus</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Edentata	<i>Choloepus hoffmanni</i>	Perico ligero o perezoso	Nicaragua al sur; W Andes hasta Ecuador; W de la Cordillera Oriental en Venezuela y algunas poblaciones en Peru, W Brasil y Bolivia (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (PNN Purace) Categoría de UICN,1996: Datos deficientes. CITES II (Von Humboldt, 1998). CITES II (Emmons,1990)
Edentata	<i>Dasyus novemcinctus subsp</i>	Cachicame, armadillo comun	S EEUU a traves de Centroamérica por los Andes occidentales hasta N Peru; E de Andes hasta Uruguay y Argentina incluyendo las islas de Margarita y Trinidad y Tobago. Nocturno y algunas veces diurno. Cazado por su carne. (Emmons,1990) Uso: Alimento, pieles, medicinal, escenico, rito, comercio (Von Humboldt,1998)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978).
Insectivora	<i>Cryptotis avia</i>		Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt,1998)	

Insectivora	<i>Cryptotis thomasi</i>		Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt,1988)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Lagomorpha	<i>Sylvilagus brasiliensis andinus</i>	Conejo de páramo; orejon	0-4500 msnm. Costa Altantica de Mexico desde Taumalipas hacia el sur a través de las partes húmedas de Centroamérica. En Suramérica hasta Tucuman, Argentina y Brasil. (Emmons, 1990) Nocturno. terrestre. Herbívoro. (ISAGEN, 1997).	Se presenta en el Volcan Galeras, (Rangel,1995) Endemica del PNN Purace y sus vecindades (Mamiferos Purace). Parque Nacional Natural Las Herosas (Downer, 1978)
Marsupialia	<i>Cryptotis avia</i>		Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt,1998)	
Marsupialia	<i>Didelphis albiventris andina</i>	Chucha, runcho, fara	Hasta 4000 msnm. E Andes y su periferia a través de los bosques lluviosos desde W Venezuela, Colombia y las Guyanas al sur hasta Ecuador, Peru, Bolivia, Paraguay, Uruguay, N Argentina y SE Brasil. Nocturno. Areas alteradas y bosque altoandino (Emmons,1990) Paramos de la Cordillera Central. Uso Comercio (Von Humboldt,1998)	Se presenta en el Volcan Galeras. (Rangel,1995.). Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Marsupialia	<i>Marmosa impavida cauae</i>	chucha raton	Panama y altas montañas del Darien, Andes desde N Colombia hasta Cochabamba, Bolivia; W Brasil. Nocturno, terrestre (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Marsupialia	<i>Philanderia opossum</i>	Chucha, mantequera, raja, rabipelao	S Mexico hasta Panama; W Andes hasta N Peru, W Andes hasta Paraguay y NE Argentina.	

			Nocturna. Arborea. Terrestre. Habita bosques secundarios, jardines, plantaciones (Emmons,1990)	
Perissodactyla	<i>Tapirus pinchaque</i>	Danta lanuda, negra o de páramo	500 – 4000 msnm. Diurno. terrestre. Herbivoro Es la especie de tapir mas primitiva. (ISAGEN,1997)	En via de extinción. (IUCN,1982). CITES I (ISAGEN, 1997). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer,1978)
Polyprotodontia	<i>Coenolestes convelatus</i>	Chucha	Paramos de Nariño y Putumayo (Von Humboldt,1998)	
Polyprotodontia	<i>Coenolestes fuliginosus</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Polyprotodontia	<i>Coenolestes obscurus</i>	Chucha	Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt,1998)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Primates	<i>Alouatta seniculus</i>	Coto, mono colorado, roncador, araguato berreador	0-3200 msnm.(ISAGEN,1997) E Andes en Colombia, Venezuela, Trinidad, Guyanas, N Brasil, Ecuador, Peru, Bolivia y W Brasil (Emmons,1990). Diurno. Estrictamente arboricola. herbivoro. Es un primate grande, estrictamente herbivoro con alta especialización folívora lo cual lo hace resistente a condiciones drásticas.(ISAGEN, 1997). Uso: Medicinal, escenico, alimento (Von Humboldt,1998)	CITES I y la UICN la cataloga como vulnerable (ISAGEN, 1997). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983). Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Primates	<i>Aotus trivirgatus</i>	Mico nocturno, mico dormilon	Se distribuye en bosques desde el nivel del mar hasta los 3200 aprox. (CVC,1991). Panama hasta el Chaco, Argentina (Emmons,1990). Uso:	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). Especie critica (CVC,1991). CITES II, IUCN lo cataloga como Amenazado

			Experimentacion medica. (CVC,1991)	(Emmons,1990). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).
Primates	<i>Cebus apella apella</i>	Mico maicero	E Andes desde Colombia y Venezuela hacia el sur hasta Paraguay y N Argentina. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace). CITES II, IUCN la cataloga como Amenazada (Emmons,1990). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).
Primates	<i>Lagothrix lagotricha lugens</i>	chorigo, churuco, choyo, chuluco	80-3000 msnm. (ISAGEN,1997). uenca alta de la amazonia, Colombia, Ecuador, Peru y Brasil. (Emmons,1990). Diurno. Estrictamente arbóreo. Herbivoro. Ejemplar capturado. Este es un buen indicador de alta diversidad de plantas. (ISAGEN,1997)	CITES I y la UICN la cataloga como vulnerable. (ISAGEN, 1997). IUCN la cataloga como Amenazada (Emmons,1990). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983). Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace)
Rodentia	<i>Agouti paca</i>	Guagua, lapa	2000-3000 msnm. SE Mexico hasta S Brasil y N Paraguay. Nocturna, terrestre. Bosques montanos, areas alteradas (Emmons,1990). Uso: Alimento, medicinal, escenico, rito, comercio (Von Humboldt,1998)	CITES III (Von Humboldt,1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983). Parque Nacional Natural Las Hermosas (Downer, 1978)
Rodentia	<i>Cavia porcellus</i>	Cuy		Se presenta en el volcan galeras. (Rangel, 1995)
Rodentia	<i>Echinoprocta rufescens</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).
Rodentia	<i>Microsciurus pucheranii subsp</i>	Ardita		Parque Nacional Natural Purace (Mamiferos Purace).

				Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Rodentia	<i>Microxus bogotensis subsp</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Rhipidomys latimanus cocalensis</i>		1000-3000 msnm. W Andes al sur hasta NW Peru. E Andes por todos los países hacia el sur hasta N Argentina, no se presenta en Paraguay. Nocturno, arboreo, solitario. Bosque montano. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Sciurus granatensis candelensis</i>	Ardilla comun, ardilla roja, alazana	Costa Rica al sur hasta Panama. W andes hasta S Ecuador, valles interandinos del N Colombia y NW Venezuela. Trinidad y Tobago. Diurna, arborea, solitaria. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Rodentia	<i>Thrinacodus albicauda</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Agouti taczanowskii</i>	Guatin de montaña	Maxima abundancia: 2000-3050 msnm. Bosques frios y nublados y paramos de las Cordilleras de Venezuela, Colombia y Ecuador.. (CVC,1991). Uso: Comercio (Von Humboldt,1998)	Categoría IUCN,1996: Casi amenazada, bajo riesgo. (Von Humboldt,1998). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983)
Rodentia	<i>Dinomys branickii peters</i>	Guagua loba	E del piedemonte de los Andes desde Colombia y Venezuela hasta Bolivia y tierras bajas del Amazonas, en Peru y W Brasil. Nocturno, herbivoro. (Emmons,1990). Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt,1998)	Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983). Parque Nacional Natural Hermosas (Downer, 1978)

Rodentia	<i>Akodon sp</i>		Hasta 5000 msnm. Todos los países andinos desde N Venezuela hasta Tierra del fuego; ausente en la region de la Guyana. Habita bosques humedos y pastizales. Terrestre, diurna. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Ichthyomys hydrobates</i>	Cusacusa	500- 3500 msnm. Nocturno, acuático-terrestre. Carnívoro-insectívoro.(ISAGEN, 1997)	
Rodentia	<i>Oligoryzomys spp</i>		Hasta 4000 msnm. Desde Mexico hasta Tierra de Fuego. Nocturno, terrestre, solitario (Emmons,1990)	
Rodentia	<i>Oligoryzomys albigularis subsp</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).
Rodentia	<i>Oryzomys dryas subsp</i>		Sur de EEUU hasta N Argentina. Nocturno, terrestre, solitario. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Oryzomys nigripes subsp</i>		Sur de EEUU hasta N Argentina. Nocturno, terrestre, solitario. (Emmons,1990)	Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Oryzomys minutus</i>		Sur de EEUU hasta N Argentina. Nocturno, terrestre, solitario. (Emmons,1990). Paramos de la Cordillera Central (Von Humboldt,1998)	
Rodentia	<i>Reithrodontomys mexicanus milleri</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace). Parque Nacional Natural Cueva Guacharos (INDERENA, 1983).

Rodentia	<i>Thomasomys aureus popayanus</i>	Cusacusa	500-3400 msnm. Nocturno. arbóreo. Herbivoro. (ISAGEN, 1997)	
Rodentia	<i>Thomasomys cinereiventer</i>	Ratón silvestre	Paramo de la Cordillera Central (Emmons,1990)	
Rodentia	<i>Thomasomys laniger subsp</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)
Rodentia	<i>Thomasomys lugens vulcani</i>			Parque Nacional Natural Purace (Mamíferos Purace)